

18. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen*

zusammengestellt von **Roland GERSTMEIER** und **Frank KÖHLER**

Für die Meldungen zum 18. Bericht der Arbeitsgemeinschaft bedanken sich die Verfasser bei: Heinz BUSSLER (Feuchtwangen), Christof HIRGSTETTER (Prien), Konrad LACKERBECK (Mauth) und Jürgen SCHMIDL (Kalchreuth). Alle Nachweise von Frank KÖHLER beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf die Umgebung Mühlendorf (Obb.). Die zahlreichen Meldungen stammen diesmal aus über 30 Familien und spiegeln die breite Tätigkeit unserer Mitarbeiter wider. Etliche Funde sind als "Neu für Bayern" und zwei Funde sind "Neu für Deutschland" (einer davon gleichzeitig "Neu für Mitteleuropa") einzustufen.

Carabidae

- Nebria picicornis*: Ried am Inn, 12.6.1984; 28.9.1985 in grobem Uferkies (leg. KÖHLER).
Nebria gyllenhali: Ried am Inn, 28.9.1985, an sandiger Uferböschung (leg. KÖHLER).
Dyschirius angustatus: Fränk. Jura bei Heideck, 2.5.1990 (leg. HIRGSTETTER, det. BAEHR), **RL 3/Bay.**
Asaphidium curtum: Bayer. Alpen, Unterwössen, 29.6.1993; Neubeuern a. Inn, 11.4.1993; Bayer. Alpen Schleching, 29.7.1994 (leg. HIRGSTETTER).
Bradycellus csikii: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER).
Badister peltatus: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER), **RL 3/Bay.**
Syntonomus foveatus: Fränk. Jura bei Heideck, 2.5.1990 (leg. HIRGSTETTER).

Histeridae

- Hetaerius ferrugineus*: Herzogenaurach, Erlangen, 9.5.1994, unter Rinde bei Ameisen am Fuß einer weißfaulen Pappel (leg. SCHMIDL).

Scydmaenidae

- Neuraphes angulatus*: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER).
Stenichnus godarti: Flossinger Forst, 2.9.1986, aus *Lasius niger*-Nest unter Rinde an Kiefernstumpf gesiebt (leg. KÖHLER).

Ptiliidae

- Ptenidium intermedium*: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER). **Wiederfund für Bayern!**

Staphylinidae

- Megarthritis hemipterus*: Viechtach-Pirka, 8.1995 (leg. STEHLING, coll. KÖHLER).
Acidota crenata: Chiemsee-Moor bei Rottau, 7.9.1994, an feuchten Stellen unter Birken gestreift (leg. HIRGSTETTER).
Stenus incrassatus: Mfr., Feuchtwangen, 20.6.1993.
Stenus picipennis: Mfr., Pleinfeld, 1.5.1990.
Stenus palustris: Obb., Prien, 18.10.1989.
Stenus ludyi: Obb., Neubeuern, Inn-Auen, 21.4.1993.

* 17. Bericht erschienen in: NachrBl. bayer. Ent. 45(3/4), 55-57, 1996.

- Stenus gallicus*: Obb., Eggstätt, Weitmoos, 16.7.1992.
Stenus eumerus: Obb., Neubeuern, Inn-Auen, 21.4.1993.
Stenus nitens: Obb., Prien, 5.10.1995.
Stenus flavipalpis: Obb., Übersee/Chiemsee, 5.8.1993.
Stenus parciior subsp. *limonensis*: Obb., Bayer. Alpen, Winkelmoosgebiet, 7.8.1993.
Stenus gracilipes: Obb., Bayer. Alpen, Lödensee, 1.7.1993.
Stenus lustrator: Obb., Prien, 5.10.1995; Bayer. Alpen, Lödensee, 23.4.1994 (alle leg. HIRGSTETTER, det. PUTHZ).
Stenus pallipes: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER). **Neu für Bayern!**
Paederus schoenherri: Mößling, 10.6.1984, auf Feuchtwiese; Ried am Inn, 28.9.1985, aus der Ufervegetation gekeschert (leg. KÖHLER).
Xantholinus flavocinctus (= *relucens*): Oberflossing, 6.9.1983, in Gartenkompost (leg. KÖHLER); für Bayern zuletzt 1926 gemeldet; **Wiederfund für Bayern!**
Xantholinus semirufus: Fränk. Jura, Schernfeld, 13.9.1990 (leg. HIRGSTETTER).
Rabigus tenuis: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER).
Mycetoporus mulsanti: Fränk. Jura, Eichstätt, 20. und 21.9.1994, von Trockenhang gestreift.
Mycetoporus forticornis: Donau-Auen bei Neuburg, 27.5.1993, gestreift.
Carphacis striatus: Ingolstadt, Gerolfinger Eichenwald, 25.6.1993.
Bolitobius cingulata: NBy., Forchheim-Willersdorf, 29.4.1972 (leg. BUCK, coll. HIRGSTETTER).
Sepedophilus (Conosoma) constans: Bayer. Alpen, Marquartstein, Ache-Auen, 30.8.1989 (in coll. SCHÜLKE). **Neu für Bayern!**
Sepedophilus bipunctatum: Fränk. Jura, Solnhofen, 26.6.1992.
Tachinus rufipennis: Bayer. Alpen, Winkelmoosgebiet, 21.8.1994.
Deinopsis erosa: Chiemsee-Moor bei Bernau, 29.4.1993 (alle Tachiporini leg. HIRGSTETTER, det. SCHÜLKE, Berlin; sofern nicht anders angegeben).
Gyrophaena pseudonana: Bayer. Alpen, Reit im Winkl, Jochberg, 22.10.1989 (leg. HIRGSTETTER); als Erstnachweis für Deutschland schon von GEISER (1984) aus der Umgebung des Rießersees (Garmisch) erwähnt.
Ischnopoda (Tachyusa) umbratica: Ried am Inn, 28.9.1985, an sandiger Uferböschung (leg. KÖHLER, det. WUNDERLE).
Amischa forcipata: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER). **Neu für Bayern!**
Atheta parapicipennis: Bayer. Alpen, Reit im Winkl, Jochberg, 22.10.1989 (leg. HIRGSTETTER).
Atheta graminicola: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER).
Rhopalotella validiuscula: Tegernsee, 6.1989; Bodenextraktion im Bergwald (leg. TOPP, det. WUNDERLE; KÖHLER in litt.). **Wiederfund für Bayern!**
Oxyopoda praecox: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER).
Aleochoa peeziana: Bayer. Alpen, Spitzstein, 900 m, 7.10. 1992 (leg. HIRGSTETTER).
Aleochoa heeri: Bayer. Alpen, Geigelstein, 1400 m, 17.6.1977 (leg. HIRGSTETTER).

Pselaphidae

- Tyrus mucronatus*: Flossinger Forst, 2.9.1986, aus *Lasius niger*-Nest unter Rinde an Kiefernstumpf gesiebt (leg. KÖHLER).

Lycidae

- Pyropterus nigroruber*: Flossinger Forst, 6.9.1983, in Fichtenforst (leg. KÖHLER); Regnitzterrasse, Umgebung St. Johann/Erlangen, 25.6.1993 (leg. BLEY, coll. SCHMIDL).

Cantharidae

- Cantharis sudetica*: Mößling, 10.6.1984, auf Feuchtwiese (leg. KÖHLER).
Cantharis montana: Krai am Inn, 12.6.1984, auf Ufervegetation (leg. KÖHLER); Neubeuern, Inn-Auen, 20.4.1994 (leg. HIRGSTETTER).
Cantharis paradoxa: Fränk. Jura, Eichstätt, 3.5.1990; Vorderriß, Isartal, 7.1991 (FRANKE, unpubliziert). **?Neu für Bayern!**

- Cantharis lateralis*: Fränk. Jura, Schernfeld, 14.6.1992, 17.5.1993, 24.5.1993.
Cantharis pagana: Fränk. Jura, Schernfeld, 18.5.1993, häufig; Bayer. Alpen, Alpenstraße/
 Schwarzbachwacht 14.6.1992
Cantharis decipiens: Fränk. Jura, Neuburg/Donau, 27.5.1993.
Rhagonycha lutea: Fränk. Jura, Schernfeld, 22.6.1994, häufig.
Rhagonycha translucida: Fränk. Jura, Schernfeld, 22.6.1994; Bayer. Alpen, Seegatterl, 24.7.1992.
Malthinus biguttatus: Fränk. Jura, Schernfeld, 15.6.1992-27.6.1994.
Malthinus frontalis: Fränk. Jura, Schernfeld, 15.6.1992.
Malthinus punctatus (= *flaveolus*): Fränk. Jura, Schernfeld, 15.6.1992 mehrfach, und 22.6.1994.
Malthinus facialis: Fränk. Jura, Schernfeld, 22.6.1994.
Malthodes liegeli: Bayer. Alpen, Hochgern, 1.6.1993; Hochmoor Pechschnait/Transtein, 28.5.
 1992, mehrfach.
Malthodes lobatus: Fränk. Jura, Schernfeld, 15.6.1991, 1♂. **Neu für Bayern!**
Malthodes holdhausi: Fränk. Jura, Schernfeld, 17.5.1993, 24.5.1993. Laut FREUDE, HARDE &
 LOHSE ist die Art nur für NÖ/Ungarn gemeldet. **Neu für Bayern! – Neu für Deutschland!**
 Im Juni 1994 auch aus Brandenburg gemeldet.

(Alle Cantharidae – sofern nicht anders vermerkt – leg. HIRGSTETTER, det. BRETZENDORFER).

Malachiidae

- Charopus concolor*: Au am Inn, Stampfelschloß, 10.6.1984 (leg. KÖHLER). **Wiederfund für Bayern!**

Cleridae

- Tillus elongatus*: Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 1.6.1992 (leg. SCHMIDL). **RL 3/Bay.**
Tilloidea unifasciata: Kitzingen/Main, 22.2.1995, aus eingetragenen Eichenästen neben zwei
 Exemplaren von *Tillus elongatus* geschlüpft (leg. BUSSLER). Die Vermutung, daß diese Art
 noch im Maingebiet vorhanden ist, kann somit bestätigt werden. **RL 1/Bay.**

Elateridae

- Sericus subaeneus*: Bayer. Alpen, Seegatterl, 1.7.1989.
Liotrichus affinis: Bayer. Alpen, Hochgern, 1.6.1993.
Ampedus rufipennis: Fränk. Jura, Schernfeld, 17.5.1993 (alle leg. HIRGSTETTER, det. WURST).
Ampedus cardinalis: Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 1.6.1992 2 Ex. in rotfaulen Kopfeichen,
 16.5.1993 1 Ex. aus rotfauler Süßkirsche!; Umg. Waldabteilung "Waldhaus" nördl.
 Heideck, 1 Ex. Totfund April 1994, 1 Ex. ex larva 1994, aus rotfauler Eiche (leg. SCHMIDL).
Ampedus brunnicornis: Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 16.5.1993, 1 Ex. aus rotfauler
 Kopfeiche (leg. SCHMIDL).
Brachygonus megerlei: Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 19.7.1992, 1 Ex. aus rotfauler
 Kopfeiche (leg. SCHMIDL).
Procaerus tibialis: Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 16.5.1993, 1 Ex. aus rotfauler Kopfeiche
 (leg. SCHMIDL).
Cardiophorus ebeninus: Kiefernwald auf Sandterrasse der Pegnitz, Röthenbach/Pegnitz östl.
 Nürnberg, 4.5.1993 je 1 Ex. (leg. SCHMIDL).
Paracardiophorus musculus: Kiefernwald auf Sandterrasse der Pegnitz, Röthenbach/Pegnitz östl.
 Nürnberg, 4.5.1993 je 1 Ex. (leg. SCHMIDL).
Cardiophorus gramineus: Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 16.5.1993, 1 Ex. am "sandigen"
 Fuß einer rotfaulen Eiche (leg. SCHMIDL).

Eucnemidae

Isorhipis marmottani: Wurde erstmals für Bayern aus dem Seeholz von R. GEISER (1990) bestätigt. Ein zweiter Nachweis gelang am 31.7.1995 aus einem Eichen-Hainbuchenwald bei Weihenzell, östlich Ansbach, 1♂ (leg. und det. BUSSLER).

Buprestidae

Scintillatrix (Lampira) rutilans: Nürnberg, 18.5.1993, in Anzahl an jungen Straßenlinden (Brusthöhendurchmesser ca. 15-20 cm, bereits mit sehr zahlreichen Ausbohrlöchern im besonnten Stammbereich) an einer vielbefahrenen Straße im östlichen Stadtgebiet (vid. SCHMIDL).

Phaenops cyanea: Au am Inn, 14.6.1984, in Puppenwiegen in der Borke einer toten Kiefer (leg. KÖHLER).

Anthaxia candens: Bergel, Windsheimer Bucht, 16.3.1993; Oberdachstetten, Lerchenbergshof, 29.12.1994, Flügeldeckenreste aus Kirschbaumrinde (leg. BUSSLER); Südhang Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 25.5.1992 2 Ex., 1.6.1992 2 Ex., 30.6.1993 2 Ex.; Röckenhof-Kalchreuth, Lkr. Erlangen, Juli 1993 1 Ex. Totfund; Umg. Baudenbach, Lkr. Neustadt-Aisch, 23.6.1993 1 Ex. Totfund; jeweils in oder an Süßkirsche (leg. SCHMIDL). Die Art ist leicht an den charakteristischen Ausbohrlöchern nachzuweisen, die – oftmals in senkrechter Ausrichtung – ausschließlich im Stammbereich und an Starkästen von Kirschen zu finden sind. **RL 2/BRD.**

Chrysobothris igniventris: Kiefernwald auf Sandterrasse der Pegnitz, Röthenbach/Pegnitz östl. Nürnberg, 2.7.1993 1 Ex., 1 Ex. ex larva 1993 (leg. SCHMIDL, vid. MÜHLE). **Neu für Bayern!** In und an armstarken, frisch abgestorbenen Kiefernästen, am Fundort zahlreiche Fraßspuren, jedoch oft von Spechten "bearbeitet".

Coroebus undatus: Hohnhausen, Umg. Hofheim (Haßberge), 1 Fragment (Kopf u. Halschild) April 1989 aus morschem Obstbaum! (leg. SCHMIDL, vid. MÜHLE). 4 weitere Ex. in einer alten Sammlung (coll. FIEDLER) an der Uni Erlangen, bezettelt lediglich mit "Erlangen", Funddatum ca. 1900-1920.

Agrilus subauratus: Herzogenaurach, Umg. Erlangen, 2 Ex. ex larva 1993 aus Salweide (leg. SCHMIDL).

Agrilus auricollis: Au am Inn, 14.6.1984, von Linde geklopft (leg. KÖHLER).

Aphanisticus pusillus: Prien, Sumpfwiese am Chiemsee, 11.9.1995 und 23.4.1996, selten, vereinzelt von Riedgräsern gestreift (leg. HIRGSTETTER).

Trachys fragariae: Sebalder Reichswald bei Neunhof, Nürnberg, 6.7.1992, 4 Ex. auf Waldlichtung (leg. SCHMIDL).

Dermestidae

Megatoma undata: Mößling, 10.6.1984, auf *Robinia pseudacacia* (leg. KÖHLER).

Trogoderma angustum: Prien, 1.8.1995, im Haus, am Fenster (leg. HIRGSTETTER).

Trogossitidae

Tenebrioides fuscus: Herzogenaurach, Umg. Erlangen, 18.3.1993, 3 Ex. aus weißfauler Pappel; Kleinsendelbach, Lkr. Forchheim, 26.5.1992, 1 Ex. aus vermulmter Kopfwende (leg. SCHMIDL).

Cerylonidae

Cerylon deplanatum: Habernhofmühle bei Weiher, Umg. Erlangen, 14.4.1992, 3 Ex. unter Rinde frisch geschlagener Pappeln (leg. SCHMIDL).

Nitidulidae

- Meligethes caudatus*: Fränk. Jura, Schernfeld, 16.6.1992. **Neu für Bayern! – Neu für Deutschland!**
 Und Leithagebirge, Donnerskirchen, Österreich. **Neu für Mitteleuropa!**
Meligethes brevis: Fränk. Jura, Eichstätt, 13.6.1992.
Meligethes coeroleovirens: Fränk. Jura, Pleinfeld, 2.5.1990.
Meligethes brachialis: Fränk. Jura, Schernfeld, 19.6.1992; Solnhofen, 25.8.1993. (Alle *Meligethes* auf
 Trockenhängen von Gras gestreift).
Cychramus variegatus: Rimsting, Chiemsee, 14.8.1994; Fränk. Jura, Schernfeld, 24.9.1994 Alle
 Nitidulidae: leg. HIRGSTETTER, det. SPORNRAFT.

Latridiidae

- Corticarina latipennis*: Fränk. Jura, Schernfeld, 18.5.1993; Neuburg, 27.5.1993 (leg. HIRGSTETTER,
 det. RÜCKER). Rotes Moor, Rhön, 10.8.1993 (leg. RENNER; KÖHLER in litt.). **Neu für
 Bayern!**
Corticarina lambiana: Fränk. Jura, Schernfeld, 30.4.1990; Bayer. Alpen, Alpenstraße/Schwarz-
 bachwacht 25.8.1990 (leg. HIRGSTETTER, det. RÜCKER). In Bayern verbreitet und in
 Fichtenbeständen nicht selten; ältere Funde bei RAUH (1993).
Latridius hirtus: Südbayern, Eggstätt, Weitmoos, 1.9.1989 (leg. HIRGSTETTER, det. RÜCKER).

Colydiidae

- Pycnomerus terebrans*: Burgberg, Erlangen, 4.5.1994, 5 Ex. bei Ameisen unter loser Rinde am Fuß
 einer abgestorbenen Eiche (leg. SCHMIDL).

Endomychidae

- Lycoperdina bovistae*: Buckenhofen, Forchheim, 13.10.1994, in Anzahl im Wald in Flaschenbovi-
 sten (leg. SCHMIDL).

Corylophidae

- Corylophus cassidioides*: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER).

Coccinellidae

- Nephus rettenbacheri*: Wörth, Donauaue, 22.2.1995 (leg. KÖHLER).
Hyperaspis campestris: Flossinger Forst, 2.9.1986, gekeschert (leg. KÖHLER, det. FÜRSCH).
RL 3/Bay.
Synharmonia lyncea: Staffelstein, 1.7.1993; 2.8.1993, von Eichenstockausschlägen aus den Nieder-
 wäldern der Eierberge geklopft (leg. HACKER, det. BUß LER). **RL 2/Bay.**

Cisidae

- Cis dentatus*: Bayer. Alpen, Alpenstraße/Schwarzbachwacht 16.8.1994 (leg. HIRGSTETTER, det.
 REIBNITZ).
Cis glabratus: Bayer. Alpen, Winklmoosgebiet, 3.6.1990 (leg. HIRGSTETTER, det. REIBNITZ).
Rhopalodontus perforatus: Südbayern, Chiemsee-Moore bei Grassau (leg. HIRGSTETTER, det.
 REIBNITZ).

Anobiidae

- Ernobius nigrinus*: Flossinger Forst, 2.9.1986, von totem Kiefernast geklopft (leg. KÖHLER).
Gastrallus laevigatus: Külbingen östl. Ansbach, Jan. bis Mai 1995 an und aus abgestorbenen
 Misteln (von abgestorbener Weißtanne; als Beifang schlüpften 136 Exemplare von *Pogono-*

cherus hispidus) (leg. BUSSLER). Nach bisheriger Kenntnis ist diese Pochkäferart an Tannennisteln gebunden. **Neu für Bayern!**
Anitya rubens: Kraftshof, Nürnberg, 6.5.1994, in Anzahl aus kernfauler Roteiche (leg. SCHMIDL).

Pythidae

Pytho depressus: Kiefernwald auf Sandterrasse der Pegnitz, Röthenbach/Pegnitz östl. Nürnberg, 15.3.1993, 3 Ex., unter Stammrinde stehender, abgestorbener Kiefern (leg. SCHMIDL).

Prostomidae

Prostomis mandibularis: Bayer. Alpen, Alpenstraße/Schwarzbachwacht, 16.8.1994, in rotfaulem, liegendem Tannenstamm, häufig (leg. HIRGSTETTER).

Pyrochroidae

Pyrochroa serraticornis: Ried am Inn, 12.6.1984, in Auwald (leg. KÖHLER).

Melandyriidae (Serropalpidae)

Eustrophus dermestoides: Burgberg Erlangen, 22.8.1994, 4 Ex. an Schwefelporling (leg. SCHMIDL).
Hallomenus binotatus: Kreuzweiher bei Röckenhof, Umg. Erlangen, 9.8.1994, 3 Ex. an Schwefelporling (leg. SCHMIDL).

Orchesia luteipalpis: Habernhofmühle bei Weiher, Umg. Erlangen, ex larva 1992; Kreuzweiher bei Röckenhof, Umg. Erlangen, ex larva 1994; Gründlach-Bruchwald, Sebalder Reichswald, Umg. Nürnberg, ex larva 1993, 1994; jeweils in Anzahl aus *Inonotus* spp. an Erle und Pappel (leg. SCHMIDL). Die Art ist im Sebalder Reichswald nicht selten und aus Schillerporlingen leicht zu züchten, oft zusammen mit *Abdera flexuosa*.

Anisoxya fuscula: Bad Windsheim-Kehrenberg, 13.5.1994, aus Eichenästen gezüchtet (leg. BUSSLER). Mittelwald bei Mittelehrenbach, Lkr. Forchheim, 2.7.1993, 1 Ex.; Sebalder Reichswald bei Ziegelstein, Nürnberg, Feb. 1994, 1 Ex. ex larva aus Eiche (leg. SCHMIDL) **RL 2/BRD**.

Conopalpus brevicollis: Bad Windsheim-Kehrenberg, 11.6.1994, in einem Eichenmittelwald geklopft (leg. BUSSLER). Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 16.5.1993, 1 Ex. nachts an rotfauler Kopfeiche (leg. SCHMIDL). **RL 1/BRD**.

Tenebrionidae

Tenebrio opacus: Ansbach/Neudorf. Von einer mächtigen Solitär-Huteeiche wurden im Herbst 1993 zwei "Mehlwürmer" zur Weiterzucht entnommen; am 10.6.1994 schlüpften zwei *Tenebrio opacus*. Am 4.7.1994 konnten beim nächtlichen Ableuchten der Eiche nochmals drei Exemplare nachgewiesen werden. Die Imagines sind ausgesprochen photophob und flüchteten als Sie vom Lampenstrahl getroffen wurden sofort in alte *Cerambyx cerdo*-Schlupflöcher oder in Holzrisse (leg. BUSSLER) **RL 2/BRD**.

Stenomax aeneus: Krai am Inn, 12.6.1984, unter Rinde einer anbrüchigen Pappel (leg. KÖHLER).

Cerambycidae

Ergates faber: Wörth/Donau, 10.8.1991, 1 Exemplar beim Leuchten gesehen (von Herrn HALX; bestätigt von Dr. SEGERER; gemeldet von Herrn HIRGSTETTER). **RL 1/Bay**.

Cortodera humeralis: Ansbach-Neudorf, 2.5.1994, in großer Anzahl von blühenden Huteeichen geklopft; Bad Windsheim-Kehrenberggebiet, 3.5.1994, in großer Anzahl auf blühendem Feldahorn zusammen mit *Cerambyx scopoli* und *Grammoptera variegata* beobachtet. An beiden Fundorten tritt nur die gelbe Abberation *suturalis* auf (leg. BUßLER) **RL 2/Bay**.

Rhopalopus femoratus: Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 13.5.1993, 2 Ex. an Eichenreisig; Gerolfinger Eichenwald, Umg. Ingolstadt, April 1994, 1 Ex. ex larva aus Haselast (leg. SCHMIDL).

- Phymatodes pusillus*: Bad Windsheim-Kehrenberggebiet, 16.4.1994, aus Eichenästen gezüchtet (leg. BUSSLER) **RL 2/Bay.**
- Phymatodes rufipes*: Hetzleser Berg, Hetzles, Lkr. Forchheim, 13.5.1993, 1 Ex. (leg. SCHMIDL).
- Xylotrechus antilope*: Mittelwald bei Mittelehrenbach, Lkr. Forchheim, 2.7.93, 3 Ex. auf frisch geschlagenen, armstarken Eichenästen "rennend" (leg. SCHMIDL). **RL 3/Bay.**
- Plagionotus detritus*: Humbrechtsau, Bad Windsheim, 16.7.1994. Die Art wurde schon 1883 von KITTEL gemeldet und konnte jetzt, nach 111 Jahren beim nächtlichen Ableuchten von Solitäreichen im Gebiet neu bestätigt werden. Während die Art im Taubertal 1993 tagaktiv nachgewiesen werden konnte (was wohl als normal gilt), wurde sie im Kehrenberggebiet im Laufe von sieben Jahren noch nie tagsüber gesichtet (leg. BUSSLER) **RL 1/Bay.**
- Saperda scalaris*: Flossinger Forst, 24.3.1984, aus Puppen an toter Erle (leg. KÖHLER).
- Menesia bipunctata*: Laffenau, Umg. Heideck, in Anz. ex. larva Mai 1994; Sinsbucher Forst, Langquaid, Lkr. Kelheim, 1 Ex. ex larva 1993; jeweils aus Faulbaum (leg. SCHMIDL).

Chrysomelidae

- Lema cyanella*: Bayer. Alpen, Reit im Winkl, 25.6.1989 (leg. HIRGSTETTER, det. KIPPENBERG).
- Pachybrachis sinuatus*: Ensfelden, 12.6.1984, in einem Steinbruch geklopft (leg. KÖHLER).
- Cryptocephalus variegatus*: Ried am Inn, 12.6.1984, auf Kiesbank an *Salix* (leg. KÖHLER).
- Chrysomela alpestris* subsp. *variabilis*: Bayer. Alpen, Schneizlreuth, 10.7.1983 (leg. HIRGSTETTER, det. KIPPENBERG).
- Chrysomela brunsvicensis*: Südbayern, Rimsting, 6.9.1995, fliegend am Rand einer Sumpfwiese (leg. HIRGSTETTER).
- Chrysomela analis*: Fränk. Jura, Eichstätt, 24.9.1995, in einer Pfütze auf Trockenhang (leg. HIRGSTETTER).
- Oreina (Chrysochloa) bifrons*: Chiemgauer Alpen, Schnappenberg, 15.5.1969; Geigelstein, 25.7.1978; subsp. *monticola*: Berchtesgaden, St. Bartholomä/Königssee 20.9.1975, 6.8.1980 (leg. HIRGSTETTER, det. KIPPENBERG).
- Phyllotreta christinae*: Südbayern, Prien, 24.7.1993 (leg. HIRGSTETTER, det. DÖBERL).
- Phyllotreta dilatata*: Wörth, Donauaue, 22.5.1995 (leg. KÖHLER).
- Longitarsus curtus*: Fränk. Jura, Dollnstein, 12.9.1990 (leg. HIRGSTETTER, det. DÖBERL).
- Longitarsus monticola*: Bayer. Alpen, Schleching, Ache-Auen, 29.9.1990; Winklmoosgebiet, 7.8.1993 (leg. HIRGSTETTER, det. DÖBERL).
- Minota carpathica*: Bayer. Alpen, Seegatterl, 1.7.1989; Ristfeuchthorn bei Schneizlreuth, 20.9.1993 (leg. HIRGSTETTER, det. DÖBERL).
- Psylliodes glabra*: Flossinger Forst, 2.9.1986, gekeschert (leg. KÖHLER, det. SIEDE).
- Cassida murraea*: Südbayern, Prien, 31.5.1996, Sumpfwiese, auf *Inula* häufig; 8 Tage später waren dort sehr viele Larven zu beobachten, kaum mehr Käfer; weitere 8 Tage später konnte nichts mehr gefunden werden (leg. HIRGSTETTER).

Anthribidae

- Dissoleucas niveostris*: Krai am Inn, 12.6.1984, von totem Pappelast geklopft (leg. KÖHLER).

Scolytidae

- Hylastes brunneus*: Flossinger Forst, 13.6.1984, von totem Kiefernast geklopft (leg. KÖHLER).
- Phloeosinus aubei*: Dinkelsbühl, Nordhang des Jurazeugenberges "Hesselberg", 27.2., 3.5.1994. Diese erstmals von HIRGSTETTER für Bayern (bei Eichstätt) nachgewiesene Art konnte in einem abgeworfenen und absterbenden Wacholderstamm in großer Zahl nachgewiesen werden (leg. BUSSLER).

Curculionidae

- Otiorynchus lugdunensis*: Mauth, 11.9.1995, ein totes Exemplar in einem Garten gefunden (leg. LACKERBECK).
- Otiorynchus subcostatus*: Bayer. Alpen, Winklmoosgebiet, 15.8.1989 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Otiorynchus subdentatus*: Bayer. Alpen, Seegatterl, 1.7.1989; 24.7.1992; Hochgern, 1.6.1993 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Otiorynchus lepidopterus (salicis)*: Bayer. Alpen, Seegatterl, 1.7.1989 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Otiorynchus pinastris*: Flossinger Forst, 13.6.1984 (leg. KÖHLER, det. BEHNE); Biburg, 25.9.1996 (leg. HENDRICKS, det. KÖHLER, in litt.).
- Otiorynchus crataegi*: Fränk. Jura, Schernfeld, 8.9.1989 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Phyllobius vespertinus*: Mößling, 10.6.1984 (leg. KÖHLER, det. DIECKMANN).
- Barypeithes tenex*: Fränk. Jura, Moernsheim/Haunsfeld 24.6.1993 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Lixus elongatus*: Krai am Inn, 12.6.1984, auf *Cirsium* (leg. KÖHLER).
- Cyphocleonus tigrinus*: Fränk. Jura, Ober-Eichstätt, 18.9.1995, auf Schutthalde unter Rosette (leg. HIRGSTETTER).
- Dryophthorus corticalis*: Flossinger Forst, 24.3.1984, unter loser Kiefernrinde; 2.9.1986, aus *Lasius niger*-Nest unter Rinde an Kiefernstumpf gesiebt (leg. KÖHLER).
- Dorytomus nebulosus*: Südbayern, Neubeuern bei Rosenheim/Inn, 20.4.1994 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Comasinus (Orthochaetes) setiger*: Biburg, 25.9.1996 (leg. HENDRICKS, det. KÖHLER, in litt.).
- Acalyptus sericeus*: Chiemsee-Moor, Bernau, 26.8.1989; Moor Pechschnait bei Traunstein, 9.5.1994 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Tychius squamulatus*: Fränk. Jura, Schernfeld, 27.6.1994 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Tychius aureolus*: Fränk. Jura, Eichstätt, 26.6.1992 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Tychius medicaginis*: Fränk. Jura, Eichstätt, 26.6.1992 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Tychius crassirostris*: Neubeuern/Inn, 20.4.1994 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Anthonomus bituberculatus*: Neubeuern/Inn, 20.4.1994, von *Crataegus* (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Pissodes scabricollis*: Biburg, 20.5., 26.6. und 25.9.1996 (leg. HENDRICKS, det. KÖHLER, in litt.).
- Magdalis armigera*: Mößling, 10.6.1984; Au am Inn, 14.6.1984, von totem Ast geklopft (leg. KÖHLER).
- Magdalis rufa*: Kiefernwald auf Sandterrasse der Pegnitz, Röthenbach/Pegnitz östl. Nürnberg, 1 Ex. 1993 ex larva aus Kiefernzweigen (leg. SCHMIDL).
- “*Acalles lemur*”: Bei dieser von GEISER (1984) gemeldeten Art handelte es sich um eine Fehlbestimmung. Herr WOLF, der sich mit dieser Gattung beschäftigt, bestimmte die Art als *Acalles camelus*.
- Pelenomus (Phytobius) velaris*: Neubeuern/Inn, 12.8.1993, auf *Polygonum ?amphibum* am überschwemmten Innufer (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE). **Neu für Bayern!**
- Ceutorhynchus constrictus*: Ingolstadt, Gerolfinger Eichenwald, 25.6.1993 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Coelastes lamii*: Neubeuern/Inn, 20.4.1994 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Gymnetron melas*: Enselden, 12.6.1984, in Steinbruch geklopft (leg. KÖHLER, det. DIECKMANN). **Wiederfund für Bayern!**
- Miarus monticola*: Flossinger Forst, 13.6.1984, zahlreich in Blüten von *Campanula patula* (leg. KÖHLER).
- Anoplus setulosus*: Ried am Inn, 12.6.1984, auf *Salix* auf Kiesbank (leg. KÖHLER).
- Rhynchaenus pilosus*: Ingolstadt, Gerolfinger Eichenwald, 25.6.1993 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).
- Rhynchaenus foliorum*: Reit im Winkl, Klappalm, in Sumpfggebiet, 23.8.1994 (leg. HIRGSTETTER, det. BEHNE).

Rhynchaenus pseudostigma: Neubeuern/Inn, 12.8.1993, von Weiden geklopft (leg. HIRGSTETER, det. BEHNE). Aschaffenburg, 23.7.1986; Habichtsthal, Spessart, 21.8.1982; Partenstein, Lohr, 12.5.1995 (alle leg. HÖHNER). **Neu für Bayern!**

Literatur

- GEISER, R. 1984: 12. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. – NachrBl. bayer. Ent. 33(3), 65-84.
 RAUH, J. 1993: Faunistisch-ökologische Bewertung von Naturwaldreservaten anhand repräsentativer Tiergruppen. – Naturwaldreservate in Bayern (München), Band 2.

Anschriften der Verfasser:

Dr. Roland GERSTMEIER
 Technische Universität München
 Angewandte Zoologie
 D-85350 Freising

Frank KÖHLER
 Strombergstraße 22a
 D-53332 Bornheim

Neue und bemerkenswerte Makrolepidopterenfunde in Salzburg

VII. Beitrag

(Insecta: Lepidoptera)

Gernot EMBACHER

Abstract

Several records of interest for the lepidoptera's fauna of Salzburg between 1993 and 1996 are presented in the following study. For the first time a specimen of the noctuid moth *Acontia lucida* (HUFNAGEL, 1766), known as to be a migrating species, has been discovered in Salzburg.

Seit 1993, dem Erscheinen des VI. Beitrages, konnten im Bundesland Salzburg wieder mehrere interessante Nachweise von Großschmetterlingen getätigt werden. Neben den bereits publizierten Neufunden von *Paranthrene insolita* (LE CERF, 1914), *Synanthedon conopiformis* (ESPER, 1782), *Synanthedon soffneri* SPATENKA, 1983, *Agriades glandon* (PRUNNER, 1798), *Lasiommata megera* (LINNAEUS, 1767), *Cilix glaucata* (SCOPOLI, 1763) und *Nycteola asiatica* (KRULIKOVSKY, 1904) gibt es mehrere Meldungen über selten nachgewiesene und sehr lokal verbreitete Arten, die hier im Folgenden angeführt werden.